

## **RENSEIGNEMENTS À L'INTENTION DES PATIENTS**

Lisez le présent dépliant attentivement avant de commencer à prendre le médicament. Si vous avez encore des questions après l'avoir lu, adressez-vous à votre médecin ou à un pharmacien.

BILTRICIDE® (praziquantel) ne peut être obtenu que sur ordonnance du médecin. Le médecin vous a prescrit le médicament pour traiter une infection causée par des vers et/ou des douves du foie. Vous ne devez donner le médicament à personne.

Lisez les importantes remarques qui suivent avant de prendre le médicament.

1. Votre pourvoyeur de soins doit connaître tous les médicaments (de prescription ou non) que vous prenez.
2. Vous ne devez pas prendre BILTRICIDE® (praziquantel) si vous avez déjà eu une réaction allergique à ce médicament.
3. Vous ne devez pas prendre BILTRICIDE® (praziquantel) et la rifampicine en même temps, parce que la quantité de praziquantel dans votre organisme pourrait être inférieure à la quantité nécessaire pour traiter l'infection.
4. Vous ne devez pas prendre le volant ni faire fonctionner une machine le jour du traitement et au cours des 24 heures suivantes, car vos réflexes peuvent être amoindris.
5. N'oubliez pas de dire à votre médecin :
  - (i) si vous êtes enceinte ou croyez l'être;
  - (ii) si vous allaitez;
  - (iii) si vous présentez une altération de la fonction rénale, une insuffisance hépatique décompensée ou des irrégularités cardiaques.
6. L'innocuité et l'efficacité de BILTRICIDE® (praziquantel) chez les enfants de moins de 4 ans n'ont pas été établies.
7. Gardez le médicament hors de la portée des enfants.

### Comment prendre le médicament

1. La dose dépend de votre poids. Vous devez prendre le médicament exactement selon les

- prescriptions du médecin. Si vous n'êtes pas certain du nombre de comprimés que vous devez prendre ou de la fréquence des prises, consultez votre médecin ou un pharmacien.
2. Vous ne devez pas modifier la dose prescrite par votre médecin.
  3. Avalez les comprimés sans les croquer avec un peu de liquide, de préférence pendant ou après les repas. Si vous n'avalez pas immédiatement le comprimé (ou la partie de comprimé), son goût amer peut vous donner des haut-le-cœur ou vous faire vomir.
  4. L'intervalle entre les prises doit être d'au moins 4 heures et d'au plus 6 heures.
  5. BILTRICIDE® (praziquantel) est présenté en comprimé à 600 mg oblong, blanc et portant trois rainures. Chaque comprimé porte l'inscription «Bayer» d'un côté et «LG» de l'autre. Quand le comprimé est divisé en quatre, chacune des parties contient 150 mg du principe actif (le praziquantel). Votre médecin peut donc facilement adapter la dose à votre poids.
  6. Pour diviser le comprimé, appuyer dans la rainure avec l'ongle du pouce. La meilleure façon d'obtenir un quart du comprimé est de briser l'un des deux bouts.

### Effets secondaires

Vous pouvez ressentir certains effets secondaires après avoir pris le médicament. Ces effets varient en fonction de la dose et de la durée du traitement. Ils dépendent aussi du type d'infection que vous présentez, ainsi que de la durée et du site de l'infection. Quand des effets secondaires surviennent, ce sont principalement les suivants : douleurs abdominales, perte d'appétit, nausées, vomissements, maux de tête, faiblesse, étourdissements, somnolence, douleurs musculaires ou fièvre. Il est souvent difficile de déterminer si les effets secondaires sont dus au médicament ou à l'infection elle-même. Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous vous sentez beaucoup plus mal après avoir pris le médicament, communiquez dès que possible avec votre médecin ou un pharmacien.

### Prise d'une dose excessive

Vous devez vous conformer à la posologie qui figure sur l'étiquette. Si vous prenez trop de comprimés, consultez sans tarder votre médecin ou rendez-vous au service des urgences de l'hôpital le plus près de chez vous.

### Rangement du médicament

Rangez le médicament à moins de 30 °C. Gardez tous les médicaments en lieu sûr, hors de la portée des enfants. Ne pas ranger dans un endroit humide. Ne pas exposer à la lumière.

Autres renseignements

Ce dépliant ne contient que quelques renseignements sur votre médicament. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou à un pharmacien.